


В ГЛХУ «КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ» ВЫЯВЛЕНЫ И ВЗЯТЫ ПОД ОХРАНУ МЕТА ОБИТАНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ И МЕСТА ПРОИЗРОСТАНИЯ РЕДКИХ И ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ.



Вид: СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ, GRUS GRUS (LINNAEUS, 1758), ШЭРЫ ЖУРАВЕЛЬ.

Класс: ПТИЦЫ (AVES).

Отряд: ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ (GRUIFORMES).

Семейство: ЖУРАВЛИНЫЕ (GRUIDAE).

Описание: Длина тела 105-130 см, размах крыльев 200-245 см. Масса самца 3,9-7,0 (5,3) кг, самки 3,8-5,4 (4,7) кг. Крупная птица характерного облика с длинной шеей и ногами. Окраска оперения самцов и самок в основном серая. На темени красная «шапочка» - участок голой бородавчатой кожи. Затылок, нижняя часть щек, горло и передняя часть шеи черные. По бокам головы от глаза проходят широкие белые полосы, соединяющиеся на задней стороне шеи, где постепенно переходят в серый цвет. Маховые перья и их кроющие черные. Рулевые перья черновато-серые, над ними нависают черные и серые длинные перья с рассученными бородавками. Ноги черные, клюв

буровато-серый. Молодые птицы окрашены более однотонно, в буровато-серые тона. Красная «шапочка» на темени у них отсутствует.

Местообитания: В период гнездования - болота разного типа, как низинные, так и верховые, а также заливаемые водой пойменные леса (в первую очередь черноольшаники) вблизи открытых пространств. Наиболее высокая численность отмечается на хорошо обводненных открытых осоковых болотах с участками тростника. Во время кормления и на отдыхе в период миграций - также поля, открытые пойменные луга.



Вид: ЧЕРНЫЙ АИСТ, CICONIA NIGRA (LINNAEUS, 1758), ЧОРНЫ БУСЕЛ.

Класс: ПТИЦЫ (AVES).

Отряд: АИСТООБРАЗНЫЕ (CICONIIFORMES).

Семейство: АИСТОВЫЕ (CICONIIDAE).

Описание: Второй по величине представитель отряда и семейства в Беларуси, незначительно уступающий по размерам белому аисту. Крупная (до 100 см длиной, массой до 3 кг) птица с длинными шеей и ногами. В полете шея вытянута. Окраска оперения черная с металлическим блеском, белые только брюхо и подхвостье. Клюв и ноги красные, у молодых оливковые.

Местообитания: Старые влажные леса по соседству с болотами, долинами рек или заболоченными лугами. Предпочитает лиственные участки - ольшаники, пойменные

дубравы, а также смешанные леса, реже селится в старых хвойных лесах. В последнее время участились случаи гнездования вблизи поселений человека (до 500 м от населенного пункта), на краю вырубок, дорог, а также случаи кормления в сельскохозяйственных угодьях, на искусственных водоемах (прудах рыбхозов, водохранилищах), вторично заболачиваемых после проведения осушительных работ территориях, где часто отмечаются скопления до нескольких десятков особей.



Вид: ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ,
HALIAEETUS ALBICILLA (LINNAEUS,
1766), АРЛАН-БЕЛАХВОСТ

Класс: ПТИЦЫ (*AVES*)

Отряд: СОКОЛООБРАЗНЫЕ
(*FALCONIFORMES*)

Семейство: ЯСТРЕБИНЫЕ
(*ACCIPITRIDAE*)

Описание: Самая крупная из гнездящихся хищных птиц Беларуси: длина тела 70-95 см, размах крыльев 200-245 см, масса до 6,5 кг. Самки несколько крупнее самцов. Окраска бурая разных оттенков, голова заметно светлее, хвост чисто белый, слегка клиновидный, клюв массивный, ярко желтый. Молодые орланы темно-бурые, хвост темный.

Существует целый ряд переходных возрастных нарядов.

Местообитания: Населяет побережья крупных озер, водохранилищ, долины больших рек, окрестности рыбхозов, соседствующих с лесными массивами. На севере населяет преимущественно характерные для региона лесо-болотно-озерные комплексы. В Полесье отдает предпочтение обширным пойменным территориям. При этом в восточной Беларуси, в поймах рек Днепр и Березина, орлан встречается на гнездовании крайне редко.



Вид: БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ,
EGRETTA ALBA (LINNAEUS, 1758),
ВЯЛКАЯ БЕЛАЯ ЧАПЛЯ

Класс: ПТИЦЫ (*AVES*)

Отряд: АИСТООБРАЗНЫЕ
(*CICONIIFORMES*)


Семейство: ЦАПЛЕВЫЕ (*ARDEIDAE*)

Описание: Крупная цапля с очень длинной, тонкой и круто изогнутой шеей, длинными ногами и относительно коротким телом (средняя длина тела 85-102 см, масса 1,1-1,5 кг). Размах крыльев 140-170 см. Оперение снежно-белое. В гнездовой период на спине имеются удлиненные рассученные перья (эгретки), несколько заходящие за хвост. Крупнее малой белой цапли в полтора-два раза, в отличие от нее имеет черные пальцы и, в гнездовое

время, желтый клюв.

Местообитание: Гнездится по берегам водоемов (в том числе и искусственных), густо поросшим кустарниками и прибрежной травянистой растительностью, в островных лесах среди закустаренных и заболоченных речных пойм. На кормежке и во время

миграций встречается также в культурном ландшафте, на мелководьях и прибрежных косах озер, рек, рыбоводных прудов.



Вид: БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ,
ADENOPHORA LILIFOLIA (L.) A. DC.,
ЗВАНOK ЛІЛЕЯЛІСТЫ

Тип: СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
(*PLANTAE VASCULARES*)

Отдел: ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) (*ANGIOSPERMAE*
(*MAGNOLIOPHYTA*))

Класс: ДВУДОЛЬНЫЕ (МАГНОЛИОПСИДЫ) (*DICOTYLEDONES*
(*MAGNOLIOPSIDA*))

Порядок: КОЛОКОЛЬЧИКОЦВЕТНЫЕ
(*CAMPANULALES*)

Семейство: КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
(*CAMPANULACEAE*)

Описание: Многолетнее травянистое растение с веретеновидным толстым корнем и крепким, прямым, густолиственным ребристым стеблем высотой 50-120 см. Листья очередные, спирально расположенные по стеблю, пилевидно-зубчатые; в нижней части стебля продолговато-яйцевидные или эллиптические, черешковые, в средней - более узкие, в верхней - сидячие, ланцетные. Цветки собраны в многоцветковую пирамидальную метелку, поникающие. Венчик колокольчатый, светло-голубой или светло-лиловый, редко белый. Столбик длиннее венчика и выставляется из него. Плод - обратногрушевидная сухая коробочка.

Местообитания: разреженные с хорошо развитым подлеском широколиственные (дубняки, липняки) и смешанные, обычно пойменные, леса, поляны, опушки с небольшим затенением. Предпочитает богатые гумусом умеренно влажные легкие почвы.

Полный список – см. www.redbook.minpriroda.gov.by